



Ilustraciones de Quelonios N° 18

Tortugas africanas de caja

William P. McCord*, Mehdi Joseph-Ouni**, and Chris Tabaka***

*East Fishkill Animal Hospital, Hopewell Junction, NY, USA


**EO Wildlife Conservation & Artistry, Brooklyn, NY, USA

***Detroit Zoo, Royal Oak, MI, USA.

Esta decimooctava entrega está dedicada al género *Kinixys* (familia Testudinidae). Se indican los nombres comunes y zoológicos, los mapas de distribución y las acuarelas originales. Su finalidad es la de servir de sumario visual de cara a la conservación de las tortugas, organizar los datos taxonómicos y zoogeográficos disponibles y servir de referencia a los aficionados. Los datos zoogeográficos se basan en IVERSON, 1992*, y en el conocimiento que tienen los autores del citado género.


Sinceras gracias a Donald G. Broadley por haber contribuido decisivamente en la finalización de casi todos los mapas de distribución.

*IVERSON, J. B., 1992. *A revised checklist with distribution maps of the turtles of the world*. Edición privada. Richmond, IN (USA).

Familia	Género	Especies	Distribución
Testudinidae	<i>Kinixys</i>	<i>K. belliana belliana</i> Gray, 1831 <i>K. belliana domerguei</i> (Vuillemin, 1972) <i>K. belliana zombensis</i> Hewitt, 1931 <i>K. erosa</i> (Schweigger, 1812) <i>K. homeana</i> Bell, 1827 <i>K. lobatsiana</i> (Power, 1927) <i>K. natalensis</i> Hewitt, 1935 <i>K. nogueyi</i> (Lataste, 1886) <i>K. spekii</i> Gray, 1863	

Kinixys belliana belliana

Tortuga de caja de Bell



Habita en sabanas semiáridas y húmedas, desde el nivel del mar a cotas altas. En dirección oeste llega hasta el centro de Camerún, Zaire, Angola y la costa de Cabinda. Hacia el norte llega hasta el extremo septentrional

de República Centroafricana, el centro-norte de Sudán (Eilai, al noroeste de Jartum), Eritrea y el extremo norte de Etiopía. En dirección este llega hasta el sur y el noroeste de Somalia y el noreste de Angola. El límite meridional abarca desde la costa sur de Somalia hasta el norte de Kenia, y desde Uganda hasta el noreste de Ruanda y el suroeste de Angola. Aunque hoy está aislada, la población angoleña probablemente estaba unida a la de República Centroafricana (Donald Broadley, com. pers.) (Roger Bour ha colaborado en el mapa).



Kinixys belliana domerguei

Tortuga de caja de Domergue



Habita en praderas y sabanas áridas y húmedas, en cotas bajas a medias. Sólo habita en una franja de 100 km² del extremo noroeste de Madagascar, en las inmediaciones

de la península e isla de Nosy Faly, Ambanja y Ambazoana, región de Sambirano. Se sospecha que ha sido introducida (Roger Bour y Olaf Pronk han colaborado en la ilustración y el mapa).



Kinixys belliana zombensis

Tortuga de caja del sureste




Habita en las sabanas húmedas y en los bosques tropicales de la llanura costera, desde cotas bajas a medias. En dirección oeste llega hasta la vertiente oriental de la Meseta Central, desde el este de Zimbabue hasta Tanzania central. Hacia el norte llega hasta la cuenca baja del río Tana y la costa sureste de Kenia. En

dirección este llega hasta el litoral tanzano y mozambiqueño. En dirección sur llega cerca de Eshowe y Richards Bay, en el noreste de Natal (República Sudafricana).



Kinixys erosa

Tortuga de caja serrada




Habita en las zonas pantanosas de los bosques perennes, en cotas bajas y medias. En dirección oeste llega hasta el oeste de Liberia y el

litoral de Camerún, Guinea Ecuatorial, Gabón, Congo, Cabinda y Zaire. Hacia el norte llega hasta el límite septentrional de los bosques perennes tropicales existentes desde Sierra Leona hasta el noreste de Zaire. En dirección este llega hasta el centro de Uganda y el este de Zaire, bordeando Ruanda, Burundi y el norte del lago Tanganika. El límite austral de su rango de distribución se sitúa en la costa occidental de África, desde Sierra Leona hasta Camerún (excepto Togo y Benín), la frontera entre Zaire y el norte de Angola, así como en la cuenca alta del río Lualaba, en los alrededores de Ankora (sureste de Zaire) (Richard Ogust ha colaborado en la ilustración).



Kinixys homeana

Tortuga de caja de Home



Habita en bosques húmedos perennes y zonas boscosas próximas a los ríos, en cotas



bajas y medias. En dirección oeste llega hasta el oeste de Liberia. Hacia el norte llega hasta los límites septentrionales de los bosques tropicales perennes existentes desde Liberia al noreste de Zaire. En dirección este llega hasta las inmediaciones de Niangara, en la región de Uele (noreste de Zaire). El límite austral de su rango de distribución es la costa occidental de África, desde Liberia hasta Camerún (excepto Togo y Benín), el noroeste de Guinea Ecuatorial, el sur de Camerún, el suroeste de República Centroafricana y el ramal norte de la cuenca del río Zaire hasta el ecuador en el norte de Zaire (Roger Bour ha colaborado en el mapa y Richard Ogust en la ilustración).

Kinixys lobatsiana

Tortuga de caja de Lobatse



Habita en sabanas áridas, zonas de monte bajo y praderas, en cotas bajas a medias. A mayor altitud también medra en afloramientos rocosos y cadenas montañosas. En dirección oeste llega




cerca de Kanye, Lobatse y Gaborone (sureste de Botswana). Hacia el norte llega cerca de Louis Trichardt (noreste de Sudáfrica). En dirección este llega hasta las Montañas Drakensberg, en Suazilandia y la provincia sudafricana de Transvaal. En dirección sur llega hasta las inmediaciones de Groblersdal y las Montañas Magaliesberg (noreste de Sudáfrica).

Kinixys natalensis

Tortuga de caja de Natal



Habita en praderas y zonas de matorrales, a menudo rocosas, en cotas bajas a medias. Hacia el oeste llega hasta Suazilandia y la provincia sudafricana de Transvaal, en concreto hasta la vertiente oriental de las Montañas Drakensberg. En dirección norte llega hasta la franja meridional de la cuenca del



rio Olifants, esto es, el noreste de Sudáfrica y el suroeste de Mozambique. En dirección este alcanza hasta las laderas orientales de las Montañas Lebombo, en la frontera de Mozambique con Transvaal y Suazilandia (no llega a la llanura del litoral). El límite sur de su rango de distribución abarca desde el oeste de Zululandia hasta las inmediaciones de Colenso y Pietermaritzburg (Natal).

Kinixys nogueyi

Tortuga de caja occidental




Habita en la sabana húmeda, zonas de matorrales y praderas, en cotas bajas a altas. El límite oeste es el litoral occidental africano, desde Senegal hasta Guinea. El límite septentrional



al es la franja norte de la sabana de África Occidental, desde Senegal hasta el oeste de Rep. Centroafricana. En dirección este llega al menos hasta las inmediaciones de Sibut, en el centro de Rep. Centroafricana. El límite meridional de su rango de distribución es la costa occidental de África, desde el extremo sureste de Costa de Marfil hasta el suroeste de Nigeria, así como el sur de Nigeria, Camerún, el sur de Nigeria y el suroeste de República Centroafricana. Los autores ascienden la subespecie *K. b. nogueyi* (Lataste, 1886) a la categoría de especie, designando el sintipo BMNH 1946.1.22.46 como el lectotipo, siendo Medina (Alto Senegal) la localidad tipo. Para ello se basan en que tiene cuatro uñas en las extremidades anteriores (*K. belliana* cinco) y en el hecho que *K. nogueyi* y *K. belliana* son simpátricas en el oeste de República Centroafricana y en el este de Camerún (Roger Bour ha colaborado en la ilustración).

Kinixys spekii

Tortuga de caja de Speke



Habita principalmente en sabanas húmedas y praderas de la Meseta Central, a veces en bosques caducifolios más secos, en cotas bajas a medias. Hacia el oeste llega hasta la cuenca alta del río Cubango en el centro de Angola. Hacia el norte



llega hasta los límites meridionales de las pluviselvas del sur de Zaire, el noreste de Ruanda, cerca de las llanuras de Kapiti, cerca de Nairobi, el sur del valle del Kerio y el límite sur de la cuenca alta del río Tana (Kenia). El límite oriental es el litoral sur de Kenia, la costa norte de Tanzania y la costa este del lago Malawi. El límite sur se sitúa en las Montañas Lebombo, en la frontera de Mozambique con Sudáfrica y Suazilandia, así como el sureste de Botsuana (inmediaciones de Mochudi, cuenca alta del río Limpopo).

REPTILIA

THE EUROPEAN HERP MAGAZINE

Choose your language

•English

•Italian

•Spanish

•German

